

Почему Методжект®?

Метотрексат – наиболее часто назначаемый базисный противовоспалительный препарат в терапии ревматоидного артрита у взрослых и ювенильного идиопатического артрита у детей, применяемый как в качестве монотерапии, так и с целью повышения эффективности генно-инженерных биологических препаратов.

Метотрексат так же широко используется для лечения псориаза, псориатического артрита и болезни Крона.

Метотрексат применяется в виде таблеток или инъекций. В виде инъекций метотрексат более эффективен и вызывает меньше побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, благодаря более высокой биодоступности.

Методжект® – метотрексат в предварительно заполненных шприцах, созданный специально для пациентов с ревматоидным артритом, ювенильным идиопатическим артритом, псориазом и псориатическим артритом и производимый в Германии.

Лечебный эффект Методжекта® проявляется через 4-8 недель после начала терапии и нарастает в течение первых 6 месяцев. Терапия может продолжаться длительное время, вплоть до нескольких лет. Перерыв в лечении обычно вызывает ухудшение течения заболевания.

Методжект® вводится один раз в неделю, желателно в один и тот же день недели, подкожно.

Наиболее часто встречающиеся нежелательные явления Методжекта® – это снижение аппетита, тошнота, диспепсия, стоматит. При появлении любых побочных эффектов, пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим врачом. При лечении Методжектом® обязательно проводится лабораторный контроль. Более подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата.

Если Вы нуждаетесь в хирургической операции, планируете беременность, кормите грудью или Вам назначены другие препараты, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим доктором.

В период лечения Методжектом® строго рекомендуется еженедельный прием фолиевой кислоты. Фолиевая кислота – витамин B9, уменьшающий неблагоприятные эффекты метотрексата.

Проконсультируйтесь со своим лечащим доктором относительно всех вопросов, касающихся применения Методжекта®.

Краткая информация по медицинскому применению препарата Методжект®

РУ: ЛСР-006731/09

Торговое название препарата: Методжект

Международное непатентованное название: метотрексат

Лекарственная форма: раствор для инъекций

Состав: 1 мл препарата содержит метотрексат динатрия 10.96 мг (эквивалентно 10 мг метотрексата)

Фармакотерапевтическая группа: антиметаболит

Код АТХ: L01BA01

Показания к применению. Ревматоидный артрит у взрослых пациентов; полиартрит у пациентов с тяжелым ювенильным хроническим артритом в активной форме; тяжелые генерализованные формы псориаза и псориатического артрита у взрослых пациентов, не отвечающих на обычную терапию.

Противопоказания. Гиперчувствительность к метотрексату или другим компонентам препарата; выраженное нарушение функции печени; алкоголизм; выраженная почечная недостаточность; нарушения кроветворения в анамнезе, такие как гипоплазия костного мозга, лейкопения, тромбоцитопения, выраженная анемия; тяжелые острые или хронические инфекционные заболевания, такие как туберкулез, ВИЧ-инфекции; язвы ротовой полости, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта в активной фазе; беременность и период кормления грудью; одновременная вакцинация живыми вакцинами; выраженный иммунодефицит.

Способ применения и дозы. Методжект назначают подкожно, внутримышечно или внутривенно. Входящая в состав упаковки игла для инъекций предназначена только для подкожного введения Методжекта. Для введения препарата внутримышечно и внутривенно необходимо использовать подходящие для этих способов введения иглы. Препарат применяют один раз в неделю. Общую продолжительность лечения определяет врач.

Взрослые пациенты с ревматоидным артритом. Рекомендуемая начальная доза составляет 7,5 мг метотрексата 1 раз в неделю внутримышечно, внутривенно или подкожно. В зависимости от выраженности заболевания и переносимости метотрексата большим доза может быть постепенно увеличена.

Пациенты с псориазом и псориатическим артритом. За неделю до начала лечения рекомендуется ввести парентерально тест-дозу 5-10 мг метотрексата для выявления реакций непереносимости. Рекомендуемая начальная доза - 7,5 мг метотрексата 1 раз в неделю внутримышечно, внутривенно или подкожно. Дозу следует постепенно увеличить, при этом максимальная доза не должна превышать 30 мг в неделю. После достижения желаемого ответа доза может быть снижена до поддерживающей.

Дети до 16 лет с полиартритной формой ювенильного хронического артрита. Рекомендуемая доза метотрексата составляет 10-15 мг/м² поверхности тела в неделю. При недостаточной эффективности лечения доза может быть увеличена вплоть до 20 мг/м² поверхности тела в неделю.

Примечания. При переходе от применения метотрексата внутрь к парентеральному способу введения может потребоваться снижение дозы из-за различия в биодоступности препарата при разных способах применения.

Форма выпуска. Раствор для инъекций 10 мг/мл. По 7,5мг/0,75мл, 10мг/1мл, 15мг/1,5мл, 20мг/2мл или 25мг/2,5мл в градуированном шприце из ней трального бесцветного стекла (тип I Е.Ф.), закрытом резиновой пробкой, с полимерной насадкой на фланец, в блистере ПВХ/бумага. Игла для инъекций в блистере ПЭ/бумага. Один наполненный шприц с препаратом и одна игла в блистере вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Более подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Методжект.


Данная информация предназначена для медицинских специалистов. Перед назначением препарата обязательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению.



Эксклюзивный представитель medac GmbH (Германия) в России

121087, г. Москва, ул. Барклай, д. 6, стр. 5, офис 417
Тел./факс: +7 (495) 258-68-94
info@tirupharm.ru
www.tirupharm.ru

Подробная информация о препарате Методжект размещена на сайте
www.metobject.ru, www.методжект.pdf



7.5
МГ

10
МГ

15
МГ

20
МГ

25
МГ

Методжект®

информация для пациентов

medac
@autoimmune

Методжект® – методика проведения инъекций

Убедитесь, что Вы выбрали нужную дозировку. Различные дозировки имеют различный цвет крылышек, которые не должны выниматься.



Откройте упаковку



Снимите защитный колпачок со шприца вращательным движением



Положите открытый шприц на упаковку



Откройте упаковку с иглой. Присоедините иглу к шприцу вращательным движением



Выберите место для инъекций:

1. на животе, но не вокруг пупка
2. на бедре, на ширину ладони ниже паховой складки и выше колена



Обработайте место инъекции дезинфицирующим раствором или специальной салфеткой



Снимите защитный колпачок иглы. Не дотрагивайтесь до стерильной иглы и не нажимайте на поршень. Не надо убирать пузырек воздуха из шприца



Сформируйте складку кожи большим и указательным пальцем. Под углом 45° полностью введите иглу под кожу.

Введите весь объем препарата из шприца медленно и равномерно, сохраняя складку кожи между пальцами.

Когда весь препарат будет введен, извлеките иглу под тем же углом, что и при введении.

Пожалуйста, меняйте место инъекции каждую неделю.

Протрите место инъекции дезинфицирующим раствором или специальной салфеткой. Если это необходимо, наложите на место инъекции лейкопластырь.